

Listerióza

Zdroj: <http://ksz.af.czu.cz/predmety/chovprasat2ks/NemociPrasat.pdf>

3.7. Listerióza (*Listeriosis*)

je infekční onemocnění projevující se (akutně/latentně)

- zánětem CNS,
- aborty u březích samic,
- původcem je *Listeria monocytogenes* (přenos možný na lidi),
- všudypřítomná,
- s dlouhou přežitelností v půdě/vodě,
- uplatňující se zpravidla u zvířat
- zesláblých (výživa, nemoci, změna střevní mikroflóry, vnitřní faktory),
- fyziologicky zatížených (březost),
- vstupující v přirozených podmínkách do organismu dutinou ústní/nosní, spojivkou.

3.7.1. Klinické příznaky

- stoupající teplota na 42,5 ° C (počátek onemocnění),
- pokles teploty pod normál (později při těžkém průběhu) s následným úhynem,
- nechutenství,
- záněty spojivek,
- chvění svalstva + nekoordinovanost pohybů,
- nekrózy kůže,
- průjmy,
- potraty.

3.7.2. Léčba a prevence

spočívá v

- podávání antibiotik (streptomycin, neomycin, bacitracin v počátku),
- přesném dodržování zoohygienických zásad (všeobecná prevence).

Zdroj: <http://ksz.af.czu.cz/predmety/chovprasat2ks/NemociPrasat.pdf>